



Piégeage de la mouche du cerise avec le piège Mc Phail et de la Capsule de phéromones pour la mouche de la cerise, *Rhagoletis cerasi*

Capsule <i>Rhagoletis cerasi</i>	Dose	Fréquence et intervalle d'introduction
Préventif	1 capsule/arbre	A renouveler toutes les 4 à 6 semaines



Introduction

- Utiliser un système de piège Mc Phail.
- Coincer la capsule dans le panier prévu à cet effet en mettant une paire de gant pour éviter de transférer de la phéromone ailleurs (sur le piège ...) sinon les mouches n'iront pas forcément se noyer dans le piège.
- Mettre de l'eau avec une goutte de liquide vaisselle ou d'huile ou de savon noir dans le réceptacle jaune pour que les mouches se noient.

Suspendre le piège sur les charpentières sous le couvert végétal à l'abri de la lumière et de l'humidité.

Conditions Introduction de mi-mai à mi-juillet.

Stockage Stockage possible 1 à 2 ans au congélateur.

Mode d'action La capsule diffuse une phéromone reproduisant celle émise par la femelle de *Rhagoletis cerasi*. Ce qui permet de capter le mâle ailé de cette espèce pour nuire à la reproduction et détecter les premiers vols d'individus.

Contrôle de succès

Quelques jours après la mise en place, les premiers individus mâles sont visibles dans les pièges. Plus tard dans la saison, les dégâts doivent être beaucoup moins visibles.